

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**ГРИППФЕРОН®**

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

**Торговое название препарата**

Гриппферон®

**Международное непатентованное название**

**или группировочное название**

Интерферон альфа - 2b

**Лекарственная форма**

Капли назальные.

**Состав**

1 мл препарата содержит:

Действующее вещество: интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный не менее 10000 МЕ.

Вспомогательные вещества: динатрия эдетата дигидрат, натрия хлорид, натрия гидрофосфата додекагидрат, калия дигидрофосфат, повидон-8 тыс, макрогол 4000, вода очищенная.

**Описание**

Прозрачный бесцветный или светло-желтый раствор.

**Фармакотерапевтическая группа**

Цитокин.

**Код АТХ**

L03AB05

**Фармакологическое действие**

Препарат обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием.

**Фармакокинетика**

При интраназальном применении концентрация действующего вещества, достигаемая в крови, значительно ниже предела обнаружения (предел опре-

деления интерферона альфа-2b – 1-2 МЕ/мл) и не имеет клинической значимости.

### **Показания к применению**

Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ у детей и взрослых.

### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость препаратов интерферона и компонентов, входящих в состав препарата.

Тяжелые формы аллергических заболеваний.

### **Применение при беременности и лактации**

Гриппферон<sup>®</sup> разрешен к применению в течение всего периода беременности в соответствии с возрастной дозой.

### **Способ применения и дозы**

При первых признаках заболевания Гриппферон<sup>®</sup> применяют в течение 5 дней:

- в возрасте от 0 до 1 года по 1 капле в каждый носовой ход 5 раз в день (разовая доза 1000 МЕ, суточная доза 5000 МЕ)
- в возрасте от 1 до 3 лет по 2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная доза 6000-8000 МЕ)
- в возрасте от 3 до 14 лет по 2 капли в каждый носовой ход 4-5 раз в день (разовая доза 2000 МЕ, суточная доза 8000-10000 МЕ)
- взрослым по 3 капли в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза 3000 МЕ, суточная доза 15000-18000 МЕ).

С целью профилактики ОРВИ и гриппа:

- при контакте с больным и/или при переохлаждении препарат закапывают в разовой возрастной дозе 2 раза в день. При необходимости профилактические курсы повторяют;
- при сезонном повышении заболеваемости препарат закапывают в возрастной дозе однократно утром с интервалом 24-48 часов.

После каждого закапывания рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Применение интраназальных сосудосуживающих препаратов совместно с Гриппфероном® не рекомендуется, так как это способствует дополнительно-му высушиванию слизистой оболочки носа.

### **Форма выпуска**

Капли назальные 10000 МЕ/мл. По 5 мл или 10 мл во флаконы пластиковые с дозатором-капельницей. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Срок годности**

2 года. Вскрытый флакон хранить не более 30 дней.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

При температуре от 2 до 8°C. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Условия отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО «ФИРН М», 143390, М.О. Наро-Фоминский район, п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д.4

### **Адрес для направления претензий**

ЗАО «ФИРН М», 127055, г. Москва, пл. Борьбы, 15/1, подъезд «В»

Тел. (495) 956-15-43, факс (495) 956-13-30

**Генеральный директор**

**ЗАО «ФИРН М»**



**Н.Е.Кириллов**

