

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**«ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА®»**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Искусственная слеза®

**Международное (непатентованное) название:** гипромеллоза

**Химическое название:** гидроксипропилметилцеллюлоза

**Лекарственная форма:** капли глазные.

**Состав 1 мл:**

Действующие вещества: гипромеллоза – 5,0 мг.

Вспомогательные вещества: борная кислота, натрия тетраборат, динатрия эдетат, макрогол 400, гистидина гидрохлорид моногидрат (в пересчете на безводное вещество), натрия хлорид, калия хлорид, вода очищенная.

**Описание:** прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** кератопротекторное средство.

**Код АТХ:** S01XA20

**Фармакологическое действие:**

Протектор эпителия роговицы, оказывает смазывающее и смягчающее действие, обладает высокой вязкостью, увеличивает продолжительность контакта раствора с роговицей. Показатель преломления раствора аналогичен естественным слезам. Восстанавливает, стабилизирует и воспроизводит оптические характеристики слезной пленки. Удлиняет действие других глазных капель и защищает роговицу от их раздражающего действия. Субъективное и объективное улучшение состояния (эпителизация, уменьшение гиперемии и очагов поражения) обычно наступает в течение 3-5 дней, выраженное улучшение или полное излечение – в течение 2-3 недель.

**Показания к применению:**

- Недостаточное слезоотделение, лагофтальм, деформация век, эктропион, состояние после пластических операций на веках, эрозия и трофические язвы роговицы, состояние после химических и термических ожогов роговицы и конъюнктивы, буллезные дистрофические изменения роговицы, кератопатия, микродефекты роговичного эпителия, состояние после кератопластики, кератоэктомии;

- для удлинения действия или устранения раздражающего действия других глазных капель;
- комбинированное лечение синдрома «сухих глаз»: синдром Стивенса-Джонсона, синдром или болезнь Шегрена, ксероз, кератоз (часто в сочетании с терапевтическими контактными линзами);
- раздражение глаз, вызванное дымом, пылью, холодом, ветром, солнцем, соленой водой, при аллергии;
- напряжение глаз при длительной работе на компьютере, вождении автомобиля;
- проведение диагностических процедур: гониоскопия, электроретинография, электроокулография, УЗИ глаз.

**Противопоказания:**

Гиперчувствительность к отдельным компонентам препарата, инфекционные заболевания глаз.

**С осторожностью:**

Острая фаза химического ожога роговицы и конъюнктивы (до полного удаления токсичных веществ и некротизированных тканей).

Нет данных по использованию препарата у детей, поэтому применять препарат следует только по назначению лечащего врача, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

**Беременность и лактация**

Опыта применения препарата во время беременности и лактации нет. Применение у беременных и кормящих матерей возможно только по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск возможных побочных эффектов.

**Способ применения и дозы:**

В конъюнктивальный мешок закапывают по 1-2 капли 4-8 раз в сутки, при необходимости можно вводить каждый час. Курс лечения – не менее 2 – 3 недель при нозологиях, требующих длительного применения.

**Побочное действие:**

Чувство склеивания век (из-за вязкости раствора), временный дискомфорт после закапывания препарата, аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:**

Не совместим с глазными каплями, содержащими соли металлов.

**Особые указания:**

Сразу после инстилляций возможна нечеткость зрительного восприятия, поэтому рекомендуется приступать к управлению автомобилем или работе с механизмами через 15 минут после закапывания препарата. Контактные

линзы снимают до инстилляции препарата и устанавливают снова не ранее, чем через 30 минут после закапывания.

**Форма выпуска:**

Капли глазные 0,5 %. По 5 и 10 мл в пластиковых флаконах с дозатором-капельницей. По 1 флакону с инструкцией по применению в пачке из картона.

**Срок годности:** 2 года. Вскрытый флакон хранить не более 30 дней.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения:** При температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

**Производитель:** ЗАО «ФИРН М», 143390, М.О.Наро-Фоминский район, п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д.4

**Адрес для направления претензий:** 127055, Москва, пл. Борьбы, 15/1, подъезд «В». Тел./ факс (495) 956-15-43.

И.о. директора ИДКЭЛС



А.Н. Васильев

Генеральный директор  
ЗАО «ФИРН М»



Н.Е.Кириллов