

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата ДИКЛОФЕНАКЛОНГ®

Регистрационный номер
ЛС-000149

Торговое название препарата:
Диклофенакнон®

**Международное непатентованное
название:** Диклофенак

Лекарственная форма:
Капли глазные.

Состав в 1 мл:
Активное вещество: диклофенак натрия –
0,001 г.

Вспомогательные вещества: гипромеллоза
0,005 г, сорбиновая кислота 0,001 г, натрия
гидрофосфат додекагидрат 0,0119 г, калия
дигидрофосфат 0,0045 г, натрия хлорид
0,0041 г, вода очищенная до 1 мл.

Описание:
Прозрачный бесцветный раствор или
прозрачный раствор желтоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:
Нестероидный противовоспалительный
препарат (НПВП).

Код АТХ: S01BC03.

Фармакологическое действие:
Диклофенак - производное фенилуксусной
кислоты, обладает противовоспалительным
и обезболивающим действием. Механизм
действия обусловлен неизбирательным
ингибированием активности циклооксиге-
назы 1 и 2, что приводит к подавлению синтеза
простагландинов в очаге воспаления.
При использовании 0,1 % раствора глазных
капель диклофенак уменьшает воспаление
глаз, возникающее в результате инфекции,
травмы или хирургической операции;
уменьшает миоз при хирургических опера-
циях, снижает синтез простагландинов во
взлугу передней камеры.

Фармакокинетика:
Максимальная концентрация вещества в
роговице и в конъюнктиве достигается к 30
минутам после закапывания. Препарат
проникает в переднюю камеру глаза; в
системное кровообращение в терапевтически
значимых концентрациях не поступает.

Показания к применению:
- ингибирование миоза во время операции
по поводу катаракты;
- лечение и профилактика воспалительных
процессов после хирургических вмеша-
тельств на глазном яблоке;
- профилактика кистозного отека макулы
после операций по поводу катаракты;
- лечение неинфекционных конъюнктивитов;
- лечение и профилактика посттравма-
тического воспалительного процесса при
проникающих и непроникающих ранениях
глазного яблока (как дополнение к местной
антибактериальной терапии).

Противопоказания:
- гиперчувствительность к компонентам
препарата;
- нарушение кроветворения неясного генеза;
- эрозивно-язвенные процессы в ЖКТ в
стадии обострения.

С осторожностью:
- зрительный герпетический кератит
(в том числе в анамнезе); заболевания,
вызывающие нарушение свертывания крови
(в т.ч. гемофилия, удлинение времени
кровотечения, склонность к кровотечениям);
бронхиальная астма, вызванная приемом
ацетилсалициловой кислоты; пожилой
возраст. У детей до 18 лет следует применять
только в случае, если ожидаемый лечебный
эффект превышает риск развития возможных
побочных эффектов.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Нет данных по применению препарата во
время беременности, в период кормления
грудью. Поэтому применять препарат у этих
категорий больных следует только, если
предполагаемая польза для матери
превышает возможный риск развития
побочных эффектов у плода или ребенка.

Способ применения и дозы:

Местно. Для ингибирования интраопера-
ционного миоза препарат закапывают в
конъюнктивальный мешок в течение 2 часов
с интервалом 30 минут (4 раза) перед
операцией.
Для профилактики кистозного отека макулы
препарат закапывают по 1 капле 3 раза в
день в течение 2-3 недель после операции.
С лечебной целью назначают по 1 капле
3-4 раза в сутки в зависимости от тяжести
состояния. Курс лечения может продол-
жаться от 1 до 2 недель.

Побочное действие:

В редких случаях во время применения
препарата отмечены следующие нежела-
тельные побочные действия: легкое или
умеренное жжение, временная потеря
четкости зрения непосредственно после
закапывания глазных капель, помутнение
роговицы (бельмо), ирит.
Аллергические реакции: зуд в глазах,
гиперемия, ангионевротический отек лица,
лихорадка, озноб, тошнота, рвота,
фотосенсибилизация, местные кожные
аллергические реакции в виде зуда и
покраснения.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата
отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

При необходимости можно применять
одновременно с другими глазными каплями,
в том числе содержащими глюкокорти-
костероиды. При этом перерыв между
закапываниями должен быть не менее

5 минут для предотвращения вымывания
действующих веществ последующими
дозами.

Особые указания:

В период лечения препаратом не рекомен-
дуется ношение мягких контактных линз.
При использовании жестких линз следует
снять их перед применением препарата
и вновь одеть через 15-20 минут после
закапывания.
При наличии инфекции или угрозе ее
развития одновременно назначают
местное антибактериальное лечение.
В период лечения необходимо соблюдать
осторожность при управлении транс-
портными средствами и занятии другими
потенциально опасными видами деятель-
ности, требующими повышенной концен-
трации внимания и быстроты психомоторных
реакций.

Флакон необходимо закрывать после каждого
использования. Не следует прикасаться
кончиком пипетки к глазу.

Форма выпуска

Капли глазные 0,1% раствор.
По 5 и 10 мл в пластиковых флаконах с
дозатором - капельницей.
Один флакон вместе с инструкцией по
медицинскому применению упакован в
пачку из картона.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Хранить в
недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года. Вскрытый флакон хранить не более
30 дней.
Не использовать после истечения срока
годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: по рецепту.

Производитель: ЗАО «Фирн М», 143390,
Московская область, Наро-Фоминский
район, п. Кокошино, ул. Дзержинский, д.4
Адрес для направления претензий:
127055, Москва, пл. Борьбы, 15/1, подъезд
«В». Тел./факс (495) 956-1543