

# ИНСТРУКЦИЯ

## по медицинскому применению лекарственного препарата ГРИППФЕРОН® с лоратадином

### Регистрационный номер

ЛП-002425

### Торговое название

Гриппферон® с лоратадином

### Международное непатентованное название или группировочное название

Интерферон альфа-2b + лоратадин

### Лекарственная форма

Мазь назальная

### Состав 1 г мази:

#### *Действующие вещества:*

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный не менее 10 000 МЕ; лоратадин 2,0 мг.

#### *Вспомогательные вещества:*

борная кислота 1 мг, натрия тетрабората декагидрат 1 мг, глицерол 90 мг, динатрия эдетата дигидрат 1 мг, гипромеллоза 2,5 мг, макрогол 4000 – 200 мг, макрогол 400 – 600 мг, вода очищенная до 1 г.

### Описание

Мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом.

### Фармакотерапевтическая группа

Цитокин + H<sub>1</sub>-гистаминовых рецепторов блокатор

### Код АТХ

Не присвоен

### Фармакологические свойства

#### Фармакодинамика

Гриппферон® с лоратадином – комбинированный лекарственный препарат, обладающий иммуномодулирующим, противовирусным и антигистаминным действием.

Интерферон альфа-2b – иммуномодулирующее и противовирусное средство.

Лоратадин – блокатор H<sub>1</sub>-гистаминовых рецепторов. Уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека слизистой оболочки полости носа.

#### Фармакокинетика

При интраназальном применении концентрация действующих веществ, достигаемая в плазме крови, значительно ниже предела обнаружения современными аналитическими методами и не имеет клинической значимости.

#### Показания к применению

Профилактика и лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в составе комплексной терапии у взрослых, в том числе у пациентов с аллергическим ринитом.

#### Противопоказания

Повышенная чувствительность к

интерферону альфа-2b, лоратадину или другим компонентам препарата, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата у детей), беременность, период грудного вскармливания.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Нет данных по использованию препарата во время беременности и лактации.

### **Способ применения и дозы**

Интраназально

#### ***Для лечения гриппа и ОРВИ***

5 раз в день смазывать слизистую оболочку носа, выпустив по 1 см препарата в каждый носовой ход в течение 7 дней.

#### ***Для профилактики гриппа и ОРВИ (после контакта с заболевшим)***

1 раз в день (утром) смазывать слизистую оболочку носа, выпустив по 1 см препарата в каждый носовой ход в течение 7 дней.

Перед нанесением мази необходимо очистить полость носа, а после нанесения – помассировать крылья носа для лучшего распределения мази по поверхности слизистой оболочки носа.

### **Побочное действие**

Возможно чиханье, зуд в месте нанесения, временное нарушение обоняния.

### **Передозировка**

Случаи передозировки препарата не выявлены.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Применение интраназальных сосудосуживающих препаратов совместно с препаратом Гриппферон® с лоратадином не рекомендуется, так как это способствует дополнительному высушиванию слизистой оболочки носа.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

### **Форма выпуска**

Мазь назальная 10 000 МЕ/г + 2 мг/г, по 5 г, 10 г в тубах алюминиевых с бушонами.

Одна туба вместе с инструкцией по применению помещена в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре от 2°C до 8°C. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Без рецепта

### **Производитель**

ЗАО «Фирн М», 143390, г. Москва, д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д.4. Тел./факс: (495) 956-15-43